

 <p>JAKOBSTAD Social- och hälsovårdsverket Sosiaali- ja terveystoimisto PIETARSAARI</p>	Asiakirjatyyppi POTILASOHJEOHJE		Sivut 1 (1)
Nimi PERÄPUKAMIEN KUMILENKKIHOITO	Laatinut: Kir.pkl Pvm 3.5.2013	Hyväksynyt: S.Å. Pvm: 8.5.2013	Päivitetty: kir.pkl Pvm: 28.4.2020
<p>PERÄPUKAMIEN KUMILENKKIHOITO (BARRONIN LIGATUURA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Peräpukamat ovat yleisin peräaukon sairaus ja yleisin peräsuoliverenvuodon syy. Peräpukamat voivat olla sisäisiä, jolloin niitä peittää limakalvo tai ulkoisia, jolloin niitä peittää iho. ○ Tämä hoitomuoto on saavuttanut vakiintuneen aseman peräpukamien hoidossa. Tällä hoitomuodolla saavutetaan yhtä hyvät tulokset kuin varsinaisella peräpukamaleikkauksella. ○ Toimenpide ei edellytä ruokavaliota eikä suolen tyhjennystä. ○ Toimenpide tehdään polikliinisesti, eikä se vaadi nukutusta eikä puudutusta. Tarkoitusta varten kehitetyn erikoisinstrumentin avulla pukaman tyven ympärille viedään tähystimen kautta tiukka kumilenkki. Kerrallaan hoidetaan tavallisesti 2-3 pukamaa. Tarvittaessa hoito uusitaan noin 4 viikon kuluttua. ○ Kumilenkkien asettamisen jälkeen peräaukon seudussa voi tuntua täyttävää tunnetta tai pientä kipua muutaman päivän ajan. Kumilenkkien vaikutuksesta pukama irtoaa 5-10 vuorokauden kuluessa. Tällöin voi esiintyä pientä verenvuotoa. ○ Toimenpide ei vaikuta normaaliin elämäänne eikä harrastuksiinne. ○ Sairaslomaa ei tarvita. ○ Tarvittaessa voitte ottaa kipuun apteekista saatavia käsikauppalääkkeitä. <p>Mahd. Kysymyksissä tai jos</p> <ul style="list-style-type: none"> ☎ ette pärjää särkylääkkeiden avulla. ☎ verenvuoto on runsasta toimenpiteen jälkeen <p>ota yhteyttä kirurgisen poliklinikan sairaanhoitajaan maanantai -perjantai klo 8-9.</p> <p>Puh.(06) 786 2245, *786 111</p>			
Viitteet/lisätiedot:			