

	Asiakirjatyyppi POTILASOHJE		Sivu 1 (1)
Nimi VIRTSARAKON GEPAN HOITO	Laatinut: Kir.pkl Pvm 7.4.2014	Hyväksynyt: C.P. Pvm: 24.4.2014	Päivitetty: kir pkl Pvm:28.4.2020
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gepan rakkohuuhtelua käytetään kroonisen rakkotulehduksen, esim interstitielli kystiitin, yliaktiivisen virtsarakon tai sädehoidon aiheuttaman kystiitin hoidossa. ➤ Virtsarakon sisäpintaa peittää läpäisemätön suojakerros. Lääkeaine voi tilapäisesti korjata vahingoittuneessa suojakerroksessa olevat aukot. ➤ Gepan annetaan yleensä kerran viikossa 4-6 viikon ajan ja sen jälkeen kerran kuukaudessa 12-18 kk:n ajan. ➤ Ennen lääkkeen antoa tulee virtsata, jotta virtsarakko olisi tyhjä. Katetrin kautta laitetaan 40 ml lääkettä virtsarakkoon. Lääkeaineen annetaan olla rakossa vähintään 30 minuutin ajan, jonka jälkeen saatte virtsata normaalisti. ➤ Ei tunnettuja sivuvaikutuksia. <p>Mahd. kysymyksissä ota yhteyttä kirurgisen poliklinikan sairaanhoitajaan maanantai – perjantai klo 14-15. Puh (06) 786 2245, *786 1111</p>			
Viitteet/lisätiedot:			
www.terveysportti.fi Gepan@instill käyttöohjeet			