

 <p>JAKOBSTAD Social- och hälsovårdsverket Sosiaali- ja terveysvirasto PIETARSAARI</p>	Dokumenttyp PATIENTANVISNING		Sida 1 (1)
Namn URINBLÅSEBEHANDLING	Uppgjord av: Kir.pkl Datum: 25.3.2011	Godkänd av: C. Palmberg Datum: 28.3.2011	Reviderad av: kir pkl Datum: 28.4.2020
Vård/förfaringssätt <ul style="list-style-type: none"> ➤ Urinprov tas före sköljningen för att kontrollera att du inte har någon urinvägsinfektion. ➤ Du skall helst inte dricka någonting 4 timmar före sköljningen, för att du skall kunna hålla medicinen i blåsan ½-2 timmar. ➤ Medicinen införs till urinblåsan via kateter. Medicinen bör hållas i blåsan ½-2 timmar, vårdpersonalen informerar om den exakta tiden i samband med behandlingen. Under tiden medicinen är i blåsan är det bra att röra sig mycket, så att medicinen kommer i kontakt med slemhinnan i hela blåsan. ➤ Medicinen tappas ut via kateter eller urineras ut. Därefter får du urinera normalt. Urinera helst sittande. ➤ Drink gärna lite extra de närmaste timmarna efter behandlingen för att skölja urinvägarna och minska eventuell irritation i urinblåsan. ➤ Behandlingsdagen skall du tvätta händerna och könsdelarna efter varje urinering så att ingen medicin lämnas kvar på huden. ➤ Ibland förekommer sveda vid urineringen efter sköljningen. ➤ Meddela oss om du får feber eller förkylningssymptom som varar mer än två dagar, svår trötthet, illamående eller liknande. Symptomen kan vara tecken på medicinbiverkningar eller infektion. ➤ Använd egen toalettstol eller torka av toaletteringen med desinfektionsmedel efter varje användning den första tiden. ➤ För att skydda din partner skall ni använda kondom eller helst avstå från könsungänge i en veckas tid efter sköljningen. <p>Vid ev. frågor kontakta kirurgiska poliklinikens sjukskötare måndag – fredag kl 8-9. Tfn (06) 786 2245, * 786 1111</p>			
Hänvisning/Tilläggsuppgifter: www.terveysportti.fi			