

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR SOM HAR BARN I DAGVÅRD

Bästa föräldrar

_____ (daghemmet)

värnar om och följer goda hygienrutiner. Vi önskar därför vänligen att Ni föräldrar stöder oss i att ge barnen en trygg vårdplats genom att Ni följer nedanstående föreskrifter.

Handtvätt för barnen

- när barnen kommer till dagvårdsplatsen
- när barnen kommer hem från dagvårdsplatsen
- alltid efter wc besök hemma och i dagvården
- före måltid hemma och i dagvården
- korta naglar

Leksaker

- Leksaker(nallen etc) för dagsvilan förvaras i barnets säng eller i eget fack
- Smutsig sovnalle tas hem och tvättas hemma minst en gång/vecka.
- Undvik att ta med egna leksaker till dagvårdsplatsen. Ifall egna leksaker tas med bör de rengöras före och även när de tas hem igen. Leksaker som inte tål rengöring ställs undan i en vecka innan de används på nytt.

Napp

- Nappen används i dagvården endast vid sovdags/dagsvilan.
- Napparna rengörs hemma
- Rena nappar förvaras i en låda där andra personliga saker finns

Tandborstning

- Tandborstning sker hemma morgon och kväll
- Barn i dagvård på kvällar/nätter: tandborstning sker under övervakning av vuxen

Då barnet insjuknar

- Om barnet insjuknar är smittorisken störst i början
- Barnet bör stanna hemma vid feber eller om barnet inte orkar delta i dagisverksamheten pga symptom. Vissa infektionssjukdomar kräver även att barnet stannar hemma en viss tid. Se bilaga.
- Eventuellt behöver föräldrarna hämta sitt barn från dagvården mitt på dagen
- Ifall barnet insjuknar:
 - kontakta alltid daghemmet
 - kontakta vid behov din hälsovårdsmottagning/telefonrådgivning för ytterligare sjukdomsinformation
- När barnet stannar hemma när det får infektionssymptom är även risken att smitta ner andra barn lägre. När **alla** följer dessa föreskrifter så hålls **alla** barn friskare.

ISOLERINGSTIDER FÖR SJUKA BARN

Bästa föräldrar

Ert barn har fått plats i kommunal dagvård, dvs. familjedagvård eller daghem.

Verksamheten förutsätter att barnet är friskt, dvs. orkar delta i lek och sysselsättning både inne och ute.

Isolering vid infektioner syftar till att förhindra smittspridning. Hur länge barnet skall stanna hemma till följd av sjukdom och konvalescenstid kräver individuell prövning. Ett sjukt barn bör garanteras en tillräcklig lång konvalescenstid.

Infektion	Smittväg	Behov av isolering
Enterovirus Höstblåsor	dropp kontakt	Smittorisken störst innan och när blåsor uppkommer Hemvård beroende på symptom
Gastroenterit - uppkastning - diarre´ - adenovirus - rotavirus - EHEC / Shigella	kontakt	Barnet vårdas hemma tills symptomfri + 1-2 symptomfria dagar Barnet vårdas hemma tills symptomfri + 2 negativa avföringsprov
Hepatit A	kontakt	En vecka efter symptomuppkomst
Hepatit B Hepatit C	blodsmitta	Barnet kan gå i dagvård Små sår täckta. Ej låna av andra hårborste, vassa saker odyl som kan ge upphov till sår åt andra Om en situation uppstår där smitta kan ha överförts till annan person– kontakta genast Jouren 06-786 2222
Herpes stomatit(blåsor i munnen)	dropp kontakt	Ingen isolering
Impetigo(svinkoppor)	kontakt	Barnet vårdas hemma 24h efter påbörjad ab-kur <u>eller</u> 48h efter påbörjad lokalbehandling
Kikhosta	dropp	Barnet vårdas hemma 5 dygn efter påbörjad ab-kur Vid hosta som varat över 3 veckor, när kikhostan diagnostiserats, behövs ingen isolering
Löss	kontakt	Behandlingsdagen
Mellanöroninfektion	dropp kontakt	Hemvård beroende på symptom Antibiotikabeh. ingen orsak till isolering
Mollusker	kontakt	Ingen isolering

Mångresistenta bakterier MRSA	kontaktsmitta	Barnet kan delta i dagvård. Vårdas i hemmet ifall vätskande sår.
ESBL		Barnet kan delta i dagvård God handhygien vid webesök
Mässling, Påssjuka, Röda hud	dropp kontakt	ca 1 vecka
Parasitsjukdomar	kontakt	Behandlingsdagen
Parvovirus (femte sjukan)		Hemvård beroende på symptom Smittar ej mera när barnet har utslag.
Salmonella	kontakt	Barnet vårdas hemma tills symptomfri + 2 symptomfria dagar. Skolelev kan gå i skolan enligt ork. Obs god hand- och wchygien trots symptomfri
Scharlakansfeber	dropp kontakt	24h efter påbörjad ab-kur, sedan beroende på symptom
Skabb	kontakt	Behandlingsdagen
Springmask	kontakt	Behandlingsdagen
Streptokock A infektion Angina	dropp	24h efter påbörjad antibiotikabehandling. Pga av symptom kan barnet behöva stanna hemma längre.
Tre dagars feber(exantem subitum)		Barnet kan gå till dagvård efter att ha varit feberfri 24h
Urinvägsinfektion	kontakt	Hemvård beroende på symptom Noggrann wchygien
Vattkoppor	dropp kontakt	Barnet vårdas hemma tills blåsorna torkat ut
Virusbetingad luftvägsinfektion	dropp kontakt	Barn med feber stannar hemma. Feberfri minst ett dygn
Ögoninflammation (konjunktivit)	kontakt	Hemvård 1-2 dygn beroende på symptom.

25.4.2014 I:\Kvalitetshandbok\Hygienmappen\Hygienföreskrifter för daghem\Information till föräldrar.doc