

 <p>JAKOBSTAD Social- och hälsovårdsverket Sosiaali- ja terveystyö PIETARSAARI</p>	Dokumenttyp PATIENTANVISNING		Sida 1 (1)
Namn <b>URINBLÅSEBEHANDLING GEPAN</b>	Uppgjord av: kir.pkl Datum: 7.4.2014	Godkänd av:C.P. Datum:24.4.2014	Reviderad av: kir pkl Datum: 28.4.2020
Vård/förfaringssätt <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gepan används vid kronisk inflammation i blåsväggen, t.ex interstitiell cystit, överaktiv urinblåsa eller strålningscystit.</li> <li>➤ Medicinen har effekt på det skyddande skiktet som täcker urinblåsans insida.</li> <li>➤ Gepan ges oftast en gång per vecka under 4-6 veckor varefter man fortsätter med en gång per månad upp till 12-18 månader.</li> <li>➤ Du bör urinera strax före behandlingen så att urinblåsan är tom när medicinen införs. Vid behandlingen införs 40 ml av medicinen via kateter. Medicinen får vara i blåsan så länge som möjligt men minst 30 min. Därefter får du urinera normalt.</li> <li>➤ Behandlingen har inga kända biverkningar.</li> </ul> <p>Vid ev. frågor kontakta kirurgiska poliklinikens sjukskötare  måndag – fredag kl 8-9  Tfn (06) 786 2245, *786 1111</p>			
Hänvisning/Tilläggsuppgifter: <a href="http://www.terveysportti.fi">www.terveysportti.fi</a> Gepan@instill bruksanvisning			