

 <p>JAKOBSTAD Social- och hälsovårdsverket Sosaali- ja terveystervasto PIETARSAARI</p>	Asiakirjatyyppe POTILASOHJE		Sivu 1 (1)
Nimi ETURAUHASEN KOEPALAN OTTO	Laatinut: Kir.pkl Pvm: 25.3.2011	Hyväksynyt: C. Palmberg Pvm: 28.3.2011	Päivitetty: Kir.pkl Pvm: 7.4.2020
Hoito-/menettelyohje <ul style="list-style-type: none"> ➤ Eturauhasen neulabiopsiassa otetaan kudospnäyte eturauhaskudoksesta peräsuolen kautta. ➤ Näytteenoton aikana makaat selällä jalat jalkatuissa. ➤ Mikäli käytät verenhennuslääkkeitä Marevan, Plavix, Clopidogrel, Xarelto tai Brilique, tulee sinun ottaa yhteyttä kirurgiseen poliklinikkaan. Mikäli käytät Aspirin, Primaspan tai Disperiniä saat ottaa ne tavalliseen tapaan. <p>Verenvuotoa</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verenvuotoa voi tulla virtsatessa tai peräsuolesta muutamia päiviä koepalan otton jälkeen. Veristä siemennestettä voi esiintyä noin kaksi kuukautta koepalanotosta. Välttääksesi räsitusä tai saunomista näytteenottopäivänä. Särkyläkkeeksi voit ottaa tarvittaessa Panadolin. <p>Tulehdus</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ennen näytepalan ottoa saat antibioottitabletin tulehdusta estämään. Jos kuitenkin saat virtsatietulehduksen ja korkean kuumeen otton jälkeen, hakeutukaa sairaalaan. <p>Jatkohoito</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vastaus tulee 2-3 viikon kuluessa, jolloin saat lääkäriltä kirjeen mistä selviää koetulos ja mahdollinen jatkohoito. <p>Mahd. kysymyksissä ota yhteyttä kirurgisen poliklinikan sairaanhoitajaan maanantai - perjantai klo 8-9. Puh.(06) 786 2245, *786 1111</p>			
Viitteet/lisätiedot:			
www.terveysportti.fi			