

 <p>JAKOBSTAD Social- och hälsovårdsverket Sosiaali- ja terveystoimisto PIETARSAARI</p>	Dokumenttyp PATIENTANVISNING		Sida 1 (1)
Namn PROSTATABIOPSI	Uppgjord av: Kir.pkl Datum: 25.3.11	Godkänd av: C. Palmberg Datum: 28.3.11	Reviderad av: enhetens namn Datum: 7.4.2020
Vård/förfaringssätt <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vid biopsi (provtagning) av prostata tar läkaren ett vävnadsprov från prostatavävnaden via ändtarmen. ➤ Vid provtagningen ligger du på rygg med benen i benstöd. ➤ Ifall du äter blodförtunnande medicin t.ex. Marevan, Plavix, Clopidogrel, Brilique eller Xarelto, bör du kontakta kirurgiska polikliniken. Om du använder Aspirin, Primaspan eller Disperin kan du ta dem som vanligt. <p>Blödning</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kan förekomma efter provtagningen, samma dag och några dagar efteråt från ändtarmen och via urinen. Blodig sperma kan förekomma i 2 månader efter provtagningen. Undvik därför anstängning eller bastubad provtagningsdagen. Behöver du ta en värktablett, använd Panadol. <p>Infektion</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Före provtagningen har du fått en tablett antibiotika för att förhindra infektion. Meddela skötaren eller läkaren om eventuell läkemedelsallergi vid ankomst till polikliniken. Ifall du trots det får en infektion med hög feber, uppsök sjukhuset. <p>Fortsättning</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ När provtagningssvaret kommit efter ca 2-3 veckor får du ett brev av läkaren där han berättar om provsvaret och ev. vidare behandling. <p>Vid ev. frågor kontakta kirurgiska poliklinikens sjukskötare måndag – fredag kl 8-9 Tfn (06) 786 2245, *786 1111</p>			
Hänvisning/Tilläggsuppgifter: www.terveysportti.fi			